

مطلب آموزشی

هفته

Deep Vein Thrombosis

ترومبوز ورید عمقی به عنوان تهدیدی جدی برای بیماران عمل شده و بیحرکت مطرح میباشد؛ در حالی که DVT قابل پیشگیری و به عنوان یک عارضه از دلایل بستری شدن در بیمارستان است و عامل ۱۰٪ از مرگ در جمعیت عمومی بیمارستان است.

ترومبوآمبولی وریدی به صورت ترومبوز وریدی عمقی (DVT) یا آمبولی ریه (PTE) بروز میکند. معیار ولز پیشینی کننده معتبری به منظور تعیین احتمال (pretest probability) برای DVT و PTE میباشد و زمانی که احتمال DVT کم باشد، به همراه نتیجه منفی آزمون DVT، D-DIMER را رد میکند.

بیماران در معرض خطر ترومبوز وریدهای عمقی

بیماران با ریسک بالا	(سن بالای ۶۰ سال، سن بین ۴۰-۶۰ سال و دارای یک فاکتور خطر دیگر)، سابقه VTE در افراد خانواده یا خود بیمار - چاقی - انعقادپذیری اکتسابی یا ارثی - بیماریهای زمینه ای مثل بیماری قلبی - عفونت - سگته های اخیر - بیماریهای التهابی - جراحی سر فمور و زانو - شکستگی لگن - ترومای شدید - صدمات نخاعی یا اعمال جراحی سرطان
بیماران با ریسک متوسط	بیمارانی که تحت عمل جراحی کوچک قرار گرفته اند ولی سن بین ۴۰-۶۰ سال دارند و به بیهوشی بیشتر از ۳۰ دقیقه نیاز دارند (قفسه صدري جراحی اعصاب)
بیماران با ریسک پائین	سن کمتر از ۴۰ سال - مدت زمان بیهوشی کمتر از ۳۰ دقیقه

واحد آموزشی دفتر

پرستاری